

FARMACI NON TRITURABILI (PT aggiornato Marzo 2016)

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                                | NOME COMMERCIALE               | Criterio            | AIC        | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA  | FALA |
|---------|---|--------------------------------|---------------------|------------|---|---|------|
| A02BC02 | OMEPRAZOLO                                      | ANTRA 20 MG CPS                | Scheda tecnica      | 028245090  | Capsule rigide gastroresistenti contenenti microgranuli gastroresistenti (vedi omeprazolo CPS).   | OMEPRAZOLO 40 mg IV fiale 10 ML   |      |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLO                                    | PANTORC*14CPR GASTR 40MG BLIST | Scheda tecnica      | 031981311  | Le compresse non devono essere masticate o frantumate, e devono essere deglutite intere con un po' di acqua 1 ora prima di un pasto.  | PANTORC*IV LIOF 40MG  |      |
|         |   | PANTORC*14CPR GASTR 20MG       | Scheda tecnica      | 031981044  |   | PANTORC*IV LIOF 40MG  |      |
| A03BB01 | BUTILSCOPOLAMINA                                | BUSCOPAN*30CPR RIV 10MG        | Scheda tecnica      | 006979025  | Le compresse devono essere assunte intere con una adeguata quantità di acqua.   | BUSCOPAN*IM IV 6F 1ML 20MG  |      |
| A04AD12 | APREPITANT                                      | EMEND*1CPS 125MG+2CPS 80MG     | Scheda tecnica      | 036167068  | Le capsule rigide devono essere deglutite intere.   |   |      |
| A04AA01 | Ondansetron                                     | ONDANSETRONE TEVA*6CPR RIV 8MG | Scheda tecnica      | 0348434041 | Le compresse da 8 mg con linea di incisione non devono essere spezzate per la somministrazione di metà dose.  | ONDANSETRONE ACC*10FL 4ML 2MG<br>SETOFILM ORODISPERSIBILI vari<br>ZOFTRAN 4MG/5ML SCIROPPO 50ML     |      |
| A05AA02 | ACIDO URSODEOSSICOLICO                          | DEURSIL 450MG 20CPS R.P.       | rilascio modificato | 023605138  | La somministrazione di DEURSIL RR va effettuata in una unica assunzione serale, capsule di gelatina dura contenenti 3 compresse a cessione differenziata.   |   |      |
| A07EA06 | BUDESONIDE                                      | ENTOCIR*50CPS 3MG R.M.         | rilascio modificato | 036507046  | Le capsule rigide gastroresistenti, vanno assunte prima dei pasti e vanno ingerite intere con un'abbondante quantità di liquido   |   |      |
| A07EA07 | BECLOMETASONE                                   | CLIPPER*30CPR 5MG R.M.         | rilascio modificato | 029136037  | Le compresse vanno ingerite intere, senza frazionarle né masticarle, con un po' d'acqua.  | TOPSTER*10SUPP 3MG<br>TOPSTER*RETT SOSP 10FL 3MG+CAN  |      |
| A07EC01 | SULFASALAZINA                                   | SALAZOPYRIN EN*100CPR 500MG    | Scheda tecnica      | 012048031  | Compresse gastroresistenti  |   |      |
| A07EC02 | MESALAZINA (5-ASA)                              | PENTACOL 800*60CPR 800MG R.M.  | rilascio modificato | 026925053  |   | PROCTASACOL*GEL RETT 20D 500MG<br>ASACOL CLISMI PRONTI, CLISMI<br>SCHIUMA, SUPPOSTE<br>vari dosaggi |      |
|         |   | PENTASA*50CPR 500MG R.M.       | rilascio modificato | 027130071  |   |   |      |
|         |   | ASACOL*60CPR GASTR 400MG       | Scheda tecnica      | 026416329  | Rivestimento gastroresistente   |   |      |
|         |   | ASACOL*60CPR GASTR 800MG       | Scheda tecnica      | 026416317  |   |   |      |
|         |   | MESALAZINA SAND*50CPR RIV500MG | Scheda tecnica      | 034836015  | Rivestimento gastroresistente   |   |      |
| A09AA02 | PANCRELIPASI                                    | CREON 25000UI*100CPS 300MG RM  | rilascio modificato | 029018049  | Se risultasse difficile deglutire le capsule queste possono essere accuratamente aperte e le minimicrosfere aggiunte a cibi acidi semisolidi (pH < 5.5) che non richiedono masticazione o assunte insieme a liquidi acidi (pH < 5.5). (...) |   |      |
|         |   | CREON 10000UI*100CPS 150MG RM  | rilascio modificato | 029018064  |   |   |      |
| A10BA02 | METFORMINA                                      | ZUGLIMET*60CPR RIV 1000MG      | Scheda tecnica      | 038257162  | La linea di frattura è solo per facilitare la rottura e quindi la deglutizione non per dividerla in due dosi uguali.  | GLUCOPHAGE POLV. OS 60 BUSTE<br>MONODOSE vari dosaggi   | FALA |
| A10BB09 | GLICLAZIDE                                      | DIAMICRON*60CPR 30MG R.M.      | rilascio modificato | 023404092  |   |   | FALA |
|         |   | GLICLAZIDE MOLTENI*40CPR 80MG  | Scheda tecnica      | 033363019  | Deglutire con acqua senza masticare   |   | FALA |
| A10BB12 | GLIMEPIRIDE                                     | AMARYL*30CPR 2MG               | Scheda tecnica      | 032845012  | Le compresse vanno ingerite con un po' di liquido senza masticarle.   |   | FALA |
|         |   | AMARYL*30CPR 3MG               | Scheda tecnica      | 032845164  |   |   | FALA |
|         |   | AMARYL*30CPR 4MG               | Scheda tecnica      | 032845226  |   |   | FALA |
| A10BD13 | ALOGLIPTIN<br>BENZOATO/METFORMINA<br>CLORIDRATO | VIPDOMET*56CPR RIV 12,5+850MG  | Scheda tecnica      | 043045057  | Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.  |   | FALA |
| A10BH03 | SAXAGLIPTIN                                     | ONGLYZA*28CPR RIV 5MG          | Scheda tecnica      | 039453028  | Le compresse non devono essere divise o tagliate.   |   | FALA |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO       | NOME COMMERCIALE                         | Criterio            | AIC        | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA               | FALA |
|---------|------------------------|--|---------------------|------------|---|--|------|
| A10BH04 | ALOGLIPTIN             | VIPIDIA*28CPR RIV 25MG                   | Scheda tecnica      | 043051212  | Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.  |  | FALA |
| A10BX09 | DAPAGLIFLOZIN          | FORXIGA*28 CPR RIV 10MG                  | Scheda tecnica      | 042494070  | Le compresse vanno deglutite intere.  |  | FALA |
| A10BX12 | EMPAGLIFLOZIN          | JARDIANCE*28 CPR RIV 25MG                | Scheda tecnica      | 043443047  | Le compresse possono essere assunte a stomaco pieno o vuoto; è necessario deglutirle intere con acqua.  |  | FALA |
| A11DA01 | TIAMINA                | BENERVA 300MG 20CPR GASTRORESISTENTE     | Scheda tecnica      | 004642031  | Le compresse sono gastroresistenti  | VITAMINA B1 Salf*IM 3F 100MG 2ML       |      |
| A11HA02 | PIRIDOSSINA            | BENADON 300MG 10CPR RIVESTITE CON FILM   | Scheda tecnica      | 001340025  | Le compresse sono gastroresistenti  | BENADON*IM IV 6F 2ML 300MG             |      |
| A12BA01 | POTASSIO CLORURO       | KCL RETARD*40CPR 600MG R.P.              | rilascio modificato | 023638012  | Le compresse a rilascio prolungato di KCl-retard vanno prese dopo i pasti e deglutite senza masticarle.   |  | FALA |
| B01AA07 | ACENOCUMAROLO          | SINTROM*20CPR 4MG                        | Scheda tecnica      | .011782012 | La compressa deve essere ingoiata per intero con un bicchiere d'acqua.  |  | FALA |
| B01AC06 | ACIDO ACETILSALICILICO | ACIDO ACETILS SAN*30CPR GASTRORESISTENTE | Scheda tecnica      | 042200016  | Le compresse devono essere inghiottite intere con una sufficiente quantità di liquido (1/2 bicchiere d'acqua).  |  | FALA |
| B01AC22 | PRASUGREL              | EFIENT*28CPR RIV 5MG                     | Scheda tecnica      | 039055025  | Non schiacciare o rompere la compressa.   |  | FALA |
|         |                        | EFIENT*28CPR RIV 10MG                    | Scheda tecnica      | 039055090  |   |  | FALA |
| B01AC24 | TICAGRELOR             | BRILIQUE*56CPR RIV 90MG                  | Scheda tecnica      | 040546044  | Le compresse possono essere frantumate in una polvere fine, mescolate in mezzo bicchiere d'acqua e bevute immediatamente. La miscela può inoltre essere somministrata attraverso un sondino naso-gastrico (CH8 o più grande).   |  | FALA |
| B01AE07 | DABIGATRAN ETEXILATO   | PRADAXA*60X1CPS 110 MG                   | Scheda tecnica      | 038451074  | Pradaxa deve essere inghiottito intero con un bicchiere. d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico.  |  | FALA |
|         |                        | PRADAXA*60X1CPS 150 MG                   | Scheda tecnica      | 038451112  |   |  | FALA |
| B01AF01 | RIVAROXYBAN            | XARELTO*28CPR RIV 20MG                   | Scheda tecnica      | 038744189  | la compressa di Xarelto può essere frantumata e mescolata con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrata per via orale. Dopo la somministrazione delle compresse rivestite con film frantumate da 15 mg o 20 mg di Xarelto, la dose deve essere seguita immediatamente dall'assunzione di cibo. |  | FALA |
|         |                        | XARELTO*30CPR RIV 10MG PP/ALU            | Scheda tecnica      | 038744076  |   |  | FALA |
|         |                        | XARELTO*42CPR RIV 15MG                   | Scheda tecnica      | 038744138  | ISMP: Le compresse triturate devono essere somministrate entro 4 ore dalla frantumazione.   |  | FALA |
| B03AA07 | FERROSO SOLFATO        | TARDYFER*30CPR 80MG RP                   | rilascio modificato | 021922024  | Deglutire la compressa intera.  | FERLIXIT*OS IV 5F 62,5MG 5ML           |      |
| C01BC03 | PROPAFENONE            | RYTMONORM*28CPS 325MG R.P.PVC/           | rilascio modificato | 024862094  | Per via del loro sapore amaro e per via dell'effetto anestetizzante locale del Propafenone, le compresse devono essere inghiottite intere (senza essere masticate) con un sorso di liquido, a stomaco pieno.  | RYTMONORM*EV 5F 70MG 20ML              |      |
|         |                        | RYTMONORM*28CPS 425MG R.P.PVC/           | rilascio modificato | 024862106  |   |  |      |
|         |                        | RYTMONORM*30CPR RIV 300MG                | Scheda tecnica      | 024862029  |   |  |      |
|         |                        | RYTMONORM*30CPR RIV 150MG                | Scheda tecnica      | 024862017  |   |  |      |
| C01BD07 | DRONEDARONE            | MULTAQ*60CPR RIV 400MG (PT-RER)          | Scheda tecnica      | 039589039  | Si consiglia di deglutire la compressa intera con un bicchiere d'acqua durante il pasto.  |  |      |
| C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATO | ISOSORBIDE M RAT*30CPR 60MG RP           | rilascio modificato | 033689035  | Deglutire la compressa intera.  | MONOCINQUE*50CPR DIV 20MG<br>025623051 |      |
|         |                        | MONOCINQUE RETARD*30CPS 80MG             | rilascio modificato | 025623048  | da ingerire con un po' di liquido, senza masticare.   | MONOCINQUE*30CPR DIV 40MG<br>025623012 |      |
|         |                        | MONOCINQUE RETARD*30CPS 50MG             | rilascio modificato | 025623024  |   |  |      |
| C01EB18 | RANOLAZINA             | RANEXA*60CPR 375MG R.P.                  | rilascio modificato | 038917011  | Le compresse di Ranexa devono essere ingerite intere, senza frantumarle, spezzarle o masticarle. Possono essere assunte con o senza cibo.   |  |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | NOME COMMERCIALE                | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA                              | FALA |
|---------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|---|---|------|
|         |                  | RANEXA*60CPR 500MG R.P.         | rilascio modificato | 038917035 |   |   |      |
|         |                  | RANEXA*60CPR 750MG R.P.         | rilascio modificato | 038917050 |   |   |      |
| C02KX01 | BOSENTAN         | TRACLEER*56CPR RIV 125MG        | ISMP                | 035609041 | Le donne in età fertile o in gravidanza non dovrebbero maneggiare compresse triturate.  |   |      |
|         |                  | TRACLEER*56CPR RIV 62,5MG       | ISMP                | 035609027 |   |   |      |
| C02KX02 | AMBRISENTAN      | VOLIBRIS*30CPR RIV 5MG          | Scheda tecnica      | 038528028 | Si raccomanda che la compressa venga deglutita intera; essa può essere assunta con o senza cibo.                                      |   |      |
|         |                  | VOLIBRIS*30CPR RIV 10MG         | Scheda tecnica      | 038528042 |   |   |      |
| C02KX04 | MACITENTAN       | OPSUMIT*30CPR RIV 10MG          | Scheda tecnica      | 043174022 | Le compresse rivestite con film non possono essere divise e devono essere deglutite intere con acqua.                                 |   |      |
| C03DA01 | SPIRONOLATTONE   | ALDACTONE*16CPS 25MG            | Scheda tecnica      | 019822028 | Aldactone deve essere inghiottito senza masticare e con una sufficiente quantità di fluidi  |   |      |
| C07AA05 | PROPANOLOLO      | INDERAL*28CPS 80MG R.P.         | rilascio modificato | 020854081 |   | INDERAL*30CPR 40MG                                    |      |
| C07AB02 | METOPROLOLO      | METOPROLOLO HEX*30CPR 100MG     | Scheda tecnica      | 032019010 | Le compresse non devono essere masticate ma possono essere rifratte a metà.   | SELOKEN*IV 5F 5ML 5MG                                 |      |
| C07AB07 | BISOPROLOLO      | CONGESCOR*28CPR RIV 1,25MG      | Scheda tecnica      | 034953024 | Devono essere deglutite con del liquido e non masticate. Le compresse con linea di frattura possono essere divise in due dosi uguali. |   |      |
|         |                  | CONGESCOR*28CPR RIV 2,5MG       | Scheda tecnica      | 034953099 |   |   |      |
|         |                  | CONGESCOR*28CPR RIV 3,75MG      | Scheda tecnica      | 034953176 |   |   |      |
|         |                  | CONGESCOR*28CPR RIV 5MG         | Scheda tecnica      | 034953253 |   |   |      |
|         |                  | CONGESCOR*28CPR RIV 10MG        | Scheda tecnica      | 034953416 |   |   |      |
| C08CA05 | NIFEDIPINA       | ADALAT CRONO*14CPR 60MG RM      | rilascio modificato | 027980022 |   |   |      |
|         |                  | NIFEDICOR RETARD*50CPR RIV 20Mg | rilascio modificato | 024608059 |   |   |      |
|         |                  | NIFEDICOR*50CPS 10MG            | Scheda tecnica      | 024608022 | In genere le capsule vanno deglutite intere con poco liquido.   | NIFEDICOR*OS FL GTT 30ML20MG/ML                       |      |
|         |                  | ADALAT CRONO*14CPR 20MG RM      | rilascio modificato | 027980034 |   |   |      |
|         |                  | ADALAT CRONO*14CPR 30MG RM      | rilascio modificato | 027980010 |   |   |      |
| C08DA01 | VERAPAMIL        | ISOPTIN*30CPR 240MG R.P.        | rilascio modificato | 020609069 |   |   |      |
|         |                  | ISOPTIN*30CPR 120MG R.P.        | rilascio modificato | 020609044 |   | ISOPTIN*30CPR RIV 80MG<br>ISOPTIN FIALE*EV 5F 5MG 2ML |      |
|         |                  | ISOPTIN*30CPR 180MG R.P.        | rilascio modificato | 020609095 |   |   |      |
| C08DB01 | DILTIAZEM        | TILDIEM*14CPS 300MG R.P.        | rilascio modificato | 025278060 | Ogni capsula contiene una miscela di microgranuli a rilascio immediato e a rilascio prolungato.                                       |   |      |
|         |                  | TILDIEM*24CPR 120MG R.P.        | rilascio modificato | 025278058 |   |   |      |
|         |                  | TILDIEM*36CPS 200MG R.P.        | rilascio modificato | 025278072 | Ogni capsula contiene una miscela di microgranuli a rilascio immediato e a rilascio prolungato.                                       | ALTIAZEM*INIET 5FL 50MG+5F 5ML                        |      |
|         |                  | TILDIEM*50CPR DIV 60MG R.M.     | rilascio modificato | 025278019 |   |   |      |
| C09AA05 | RAMIPRIL         | TRIA TEC*28CPR DIV 2,5MG        | Scheda tecnica      | 027161052 | Triatec deve essere deglutito con un liquido e non deve essere masticato o sbriciolato.   |   |      |
|         |                  | TRIA TEC*14CPR DIV 5MG          | Scheda tecnica      | 027161064 |   |   |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                 | NOME COMMERCIALE                    | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA  | FORMULAZIONE ALTERNATIVA  | FALA |  |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--|---|------|--|
|         |                                  | TRIA TEC*28CPR DIV 10MG             | Scheda tecnica      | 027161076 |  |   |      |  |
| C09BA05 | RAMIPRIL + IDROCLOROTIAZIDE      | TRIA TEC HCT*14CPR 2,5+12,5MG       | Scheda tecnica      | 028531010 | Triatec HCT deve essere deglutito con un liquido e non deve essere masticato o sbriciolato   |   |      |  |
|         |                                  | TRIA TEC HCT*14CPR 5MG+25MG         | Scheda tecnica      | 028531022 |  |   |      |  |
| C10AA04 | FLUVASTATINA                     | LESCOL*28CPR 80MG R.P.              | rilascio modificato | 029163033 |  |   |      |  |
| C10BA02 | EZETIMIBE+SIMVASTATINA           | INEGY*30CPR 10MG/10MG PVC/AL/       | Scheda tecnica      | 036679064 | La compressa non deve essere divisa.   |   |      |  |
|         |                                  | INEGY*30CPR 10MG/20MG PTFE/PVC      | Scheda tecnica      | 036679215 |  |   |      |  |
|         |                                  | INEGY*30CPR 10MG/40MG PTFE/PVC      | Scheda tecnica      | 036679367 |  |   |      |  |
| D05BB02 | ACITRETINA                       | ZORIAS*20CPS 10MG                   | Scheda tecnica      | 041619014 | Le capsule rigide devono essere assunte intere una volta al giorno con i pasti o con un bicchiere di latte   |   |      |  |
|         |                                  | ZORIAS*20CPS 25MG                   | Scheda tecnica      | 041619065 |  |   |      |  |
| G03BA03 | TESTOSTERONE                     | ANDRIOL 40MG 60CPS RIGIDE (PT)      | Scheda tecnica      | 024585034 | Le capsule vanno ingerite senza essere masticate, con un po' di acqua.   |   |      |  |
| G04CA01 | ALFUZOZINA                       | XATRAL*30CPR RIV 2,5MG              | Scheda tecnica      | 027314018 | Le compresse devono essere ingerite intere.  |   |      |  |
|         |                                  | XATRAL*30CPR 10MG R.P.              | rilascio modificato | 027314044 |  |   |      |  |
| G04CA02 | TAMSULOSINA                      | OMNIC*20CPS 0,4MG R.M.              | rilascio modificato | 032647024 | La capsula deve essere deglutita intera e non deve essere frantumata o masticata   |   |      |  |
| G04CB01 | FINASTERIDE                      | FINASTERIDE TEVA*15CPR RIV 5MG      | Scheda tecnica      | 038791024 | La compressa deve essere ingerita intera e non deve essere spezzata o sgretolata   |   |      |  |
| H05BX01 | CINACALCET                       | MIMPARA*28CPR RIV 30MG              | Scheda tecnica      | 036598023 | Le compresse devono essere assunte intere e non divise.  |   |      |  |
|         |                                  | MIMPARA*28CPR RIV 60MG              | Scheda tecnica      | 036598050 |  |   |      |  |
|         |                                  | MIMPARA*28CPR RIV 90MG              | Scheda tecnica      | 036598098 |  |   |      |  |
| J01CR02 | AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO | AMOXICILLINA AC.CLA 875MG+125MG 12C | Scheda tecnica      | 36980047  | Le compresse rivestite con film devono essere assunte intere, senza masticare, accompagnate da un sorso d'acqua.                                       | AUGMENTIN*BB SOSP FL 70ML C/C<br>AMOXIC.AC.CLAVUL.IBI*12BUST            |      |  |
| J01FA02 | SPIRAMICINA                      | ROVAMICINA*12CPR RIV 3000000UI      | Scheda tecnica      | 012322020 | Le cpr devono essere ingerite, senza masticarle, con abbondante liquido.   |   |      |  |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINA                   | CIPROXIN*10CPR RIV 250MG            | Scheda tecnica      | 026664019 | Le compresse devono essere inghiottite con un po' di liquido, senza masticarle.  |   |      |  |
|         |                                  | CIPROXIN*6CPR RIV 500MG             | Scheda tecnica      | 026664021 |  | CIPROXIN*OS SOSP 100ML 250MG/5ML  |      |  |
|         |                                  | CIPROFLOXACINA SA*12CPR 750MG       | Scheda tecnica      | 037464563 |  |   |      |  |
| J01MA12 | LEVOFLOXACINA                    | LEVOFLOXACINA SAN*5CPR 500MG        | Scheda tecnica      | 040219139 | Le compresse di Levofloxacin Sandoz compresse rivestite con film devono essere inghiottite senza masticare con un quantitativo sufficiente di liquido. | LEVOFLOXACINA KABI*INF 10FL 100ML                                       |      |  |
| J01MA14 | MOXIFLOXACINA                    | AVALOX*5CPR RIV 400MG PP/AL         | Scheda tecnica      | 034436016 | La compressa rivestita con film deve essere deglutita intera con una sufficiente quantità di liquido e può essere assunta indipendentemente dai pasti. |   |      |  |
| J02AC01 | FLUCONAZOLO                      | DIFLUCAN 100MG 10CPS RIGIDE         | Scheda tecnica      | 027267044 | Le capsule devono essere deglutite intere.   | DIFLUCAN*OS SOSP 350MG 50MG/5ML<br>FLUCONAZOLO KABI*10FL 50ML<br>2MG/ML |      |  |
|         |                                  | DIFLUCAN 150MG 2CPS RIGIDE          | Scheda tecnica      | 027267020 |  |   |      |  |
|         |                                  | DIFLUCAN 200 MG CPS                 | Scheda tecnica      | 027267095 |  |   |      |  |
|         |                                  | DIFLUCAN 50MG 7CPS RIGIDE           | Scheda tecnica      | 027267018 |  |   |      |  |
| J04AK05 | BEDAQUILINA                      | SIRTURO*FL 188CPR 100MG             | Scheda tecnica      | 043332016 | Le compresse di SIRTURO devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.   |   |      |  |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO    | NOME COMMERCIALE              | Criterio       | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA                                | FALA |
|---------|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---|---|------|
| J05AB04 | RIBAVIRINA          | COPEGUS*42CPR RIV 200MG       | Scheda tecnica | 035745013 | A causa del potenziale teratogeno della ribavirina, le compresse non devono essere rotte o schiacciate.   | REBETOL SOL ORALE 100 MG 40MG/ML                        |      |
|         |                     | COPEGUS*FL 56CPR RIV 400MG    | Scheda tecnica | 035745064 |   |   |      |
|         |                     | REBETOL*84CPS 200MG           | Scheda tecnica | 034459014 |   |   |      |
| J05AB14 | VALGANCICLOVIR      | DARILIN*60CPR RIV 450MG       | Scheda tecnica | 035740012 | Le compresse non devono essere rotte o frantumate. Poiché Darilin è considerato potenzialmente teratogeno e carcinogeno per l'uomo, deve essere posta attenzione nel maneggiare compresse rotte   | VALCYTE SOL ORALE 50MG/ML 12 G                          |      |
| J05AE01 | SAQUINAVIR          | INVIRASE*FL 120CPR RIV 500MG  | Scheda tecnica | 030675021 | Le compresse rivestite con film di Invirase devono essere deglutite intere e assunte insieme a ritonavir durante o dopo un pasto.   |   |      |
| J05AE02 | INDINAVIR           | CRIVAN*180CPS 400MG           | Scheda tecnica | 030644025 | Le capsule rigide devono essere ingerite intere.(le capsule possono essere aperte e mescolate a una purea di frutta es. banana per camuffare il gusto sgradevole) ISMP  |   |      |
| J05AE03 | RITONAVIR           | NORVIR*FL 30CPR RIV 100MG     | Scheda tecnica | 030081057 | Norvir compresse rivestite con film vengono somministrate per via orale e devono essere assunte con il cibo (vedere paragrafo 5.2).   | NORVIR*OS 5FL 90ML 80MG/ML                              |      |
| J05AE06 | LOPINAVIR+RITONAVIR | KALETRA*120CPR RIV 200MG+50MG | Scheda tecnica | 035187071 | Le compresse rivestite con film di Kaletra devono essere ingoiate per intero e non vanno masticate, divise o frantumate.  | KALETRA*OS 5FL 60ML+5SIR                                |      |
| J05AE07 | FOSAMPRENAVIR       | TELZIR*1FL 60CPR RIV 700MG    | Scheda tecnica | 036475010 | Telzir è anche disponibile in forma di sospensione orale  | TELZIR OS SOSP 50 MG/ML 225 ML                          |      |
| J05AE08 | ATAZANAVIR          | REYATAZ*60CPS 200MG           | Scheda tecnica | 036196069 | Le capsule devono essere deglutite intere.  |   |      |
|         |                     | REYATAZ*1FL 30CPS 300MG       | Scheda tecnica | 036196083 |   |   |      |
| J05AE14 | SIMEPREVIR          | OLYSIO*28CPS 150MG            | Scheda tecnica | 043441029 | OLYSIO deve essere assunto per via orale una volta al giorno con il cibo. Le capsule devono essere deglutite intere   |   |      |
| J05AF02 | DIDANOSINA          | VIDEX*30CPS GASTR 400MG       | Scheda tecnica | 028341194 | Per ottimizzare l'assorbimento, le capsule gastroresistenti devono essere assunte intatte con almeno 100 ml di acqua. Bisogna spiegare ai pazienti di non aprire le capsule per facilitare la somministrazione, dal momento che ciò potrebbe ridurre l'assorbimento   | VIDEX 2 G POLVERE PER SOL ORALE                         |      |
|         |                     | VIDEX*30CPS GASTR 200MG       |                |           |   |   |      |
|         |                     | VIDEX*30CPS GASTR 125MG       |                |           |   |   |      |
|         |                     | VIDEX*30CPS GASTR 250MG       | Scheda tecnica | 028341182 |   |   |      |
| J05AF05 | LAMIVUDINA          | EPIVIR 150MG 60CPR            | Scheda tecnica | 031984026 | Al fine di garantire la somministrazione dell'intera dose, la compressa dovrebbe idealmente essere deglutita senza essere frantumata.   | ZEFFIX*OS FL 240ML 5MG/ML<br>EPIVIR*OS FL 240ML 10MG/ML |      |
|         |                     | LAMIVUDINA MY*30CPR RIV 300MG | Scheda tecnica | 040485082 | Per assicurare la somministrazione dell'intera dose, la(e) compressa(e) dovrebbe idealmente essere deglutita senza frantumarla. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse, la lamivudina è disponibile in forma di soluzione orale. In alternativa, le compresse possono essere frantumate ed aggiunte ad una piccola quantità di cibo semi-solido o liquido, da consumarsi immediatamente |   |      |
| J05AF06 | ABACAVIR            | ZIAGEN*6BLISTER 10CPR 300MG   | Scheda tecnica | 034499018 | Al fine di garantire la somministrazione dell'intera dose, la compressa deve idealmente essere deglutita senza essere rotta.  | ZIAGEN*OS FL 240ML 20MG/ML                              |      |
| J05AF11 | TELBIVUDINA         | SEBIVO*28CPR RIV 600MG        | Scheda tecnica | 037884018 | La compressa non deve essere masticata, suddivisa o frantumata.   |   |      |
| J05AG01 | NEVIRAPINA          | NEVIRAPINA TEVA*60CPR 200MG   | Scheda tecnica | 042019012 | Le compresse devono essere assunte con del liquido e non devono essere né frantumate, né masticate.   | VIRAMUNE*OS SOSP FL240ML<br>50MG/ML                     |      |
| J05AG04 | ETRAVIRINA          | INTELENCE*FL 60CPS 200MG      | Scheda tecnica | 038703029 | I pazienti devono essere istruiti a deglutire le compresse intere con un liquido come l'acqua. I pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse intere, possono disciogliere le compresse in un bicchiere d'acqua Per le istruzioni su come disciogliere il medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 del RCP   |   |      |
|         |                     | INTELENCE*FL 120CPR 100MG     | Scheda tecnica | 038703017 |   |   |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO   | NOME COMMERCIALE               | Criterio       | AIC        | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA  | FORMULAZIONE ALTERNATIVA                | FALA |
|---------|--|--------------------------------|----------------|------------|--|---|------|
| J05AG05 | RILPIVIRINA  | EDURANT*FL 30CPR RIV 25MG      | Scheda tecnica | 041664018  | Si raccomanda che Edurant compressa rivestita con film sia assunta intera con acqua e non sia masticata o rotta  |   |      |
| J05AR02 | LAMIVUDINA+ABACAVIR  | KIVEXA*BL 30CPR RIV 600MG+300M | Scheda tecnica | .036644019 | Kivexa non deve essere somministrato a bambini che pesano meno di 25 kg dal momento che, essendo una compressa a dose fissa, tale dose non può essere ridotta.   | valutare terapia con p.a. non associati |      |
| J05AR03 | EMTRICITABINA+ TENOFOVIR   | TRUVADA*30CPR RIV 200MG/245MG  | Scheda tecnica | 036716013  | Truvada può essere disciolto in circa 100 ml di acqua, succo d'arancia o succo d'uva e assunto immediatamente.   |   |      |
| J05AR06 | EMTRICITABINA+ TENOFOVIR+ EFAVIRENZ                                    | ATRIPLA*30CPR RIV600+200+245MG | Scheda tecnica | 038307017  | Le compresse di Atripla devono essere inghiottite intere con acqua, una volta al giorno  | valutare terapia con p.a. non associati |      |
| J05AR08 | EMTRICITABINA + RILPIVIRINA CLORIDRATO + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO | EVIPLERA*FL 30CPR 25+200+245MG | Scheda tecnica | 041711019  | Si raccomanda di inghiottire Eviplera intero con un po' d'acqua. La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata, in quanto ciò potrebbe influenzare l'assorbimento di Eviplera.  | valutare terapia con p.a. non associati |      |
| J05AR09 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR DISOPROXIL, ELVITEGRAVIR E COBICISTAT         | STRIBILD*FL 30CPR RIV          | Scheda tecnica | 042815011  | La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata.  | valutare terapia con p.a. non associati |      |
| J05AX08 | RALTEGRAVIR  | ISENTRESS*FL 60CPR RIV 400MG   | Scheda tecnica | 038312017  | Non è raccomandato masticare, frantumare o dividere le compresse da 400mg.   | ISENTRESS 25-100 MG 60 CPR MAST         |      |
| J05AX14 | DACLATASVIR  | DAKLINZA*28CPR RIV 60MG        | Scheda tecnica | 043542036  | Daklinza deve essere assunto per via orale con o senza cibo. I pazienti devono essere avvertiti di deglutire la compressa intera. La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata a causa del sapore sgradevole del principio attivo.   |   |      |
| J05AX15 | SOFOSBUVIR   | SOVALDI*1FL 28CPR RIV 400MG    | Scheda tecnica | 043196017  | I pazienti devono essere istruiti a deglutire la compressa intera. La compressa rivestita con film non deve essere masticata o frantumata, in quanto il principio attivo ha un gusto amaro. La compressa deve essere assunta con il cibo.  |   |      |
| J05AX16 | DASABUVIR  | EXVIERA*56 CPR RIV 250MG       | Scheda tecnica | 043840014  | Le compresse rivestite con film sono per uso orale. I pazienti devono essere istruiti a deglutire le compresse intere (ovvero i pazienti non devono masticare, frantumare o sciogliere la compressa).  |   |      |
| J05AX65 | LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR  | HARVONI*1FL 28CPR RIV 90+400MG | Scheda tecnica | 043731013  | I pazienti devono essere istruiti a deglutire la compressa intera, con o senza cibo. A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare la compressa rivestita con film.   |   |      |
| J05AX67 | OMBITASVIR/PARITRAREVIR/RITONAVIR                                      | VIEKIRAX*56CPR 12,5+75+50MG    | Scheda tecnica | 043841016  | Le compresse rivestite con film sono per uso orale. I pazienti devono essere istruiti a deglutire le compresse intere (ovvero i pazienti non devono masticare, frantumare o sciogliere la compressa).  |   |      |
| L01AA01 | CICLOFOSFAMIDE   | ENDOXAN BAXTER*50CPR RIV 50MG  | Oncologico     | 015628011  | Le compresse non devono essere divise o frantumate.  |   | FALA |
| L01AA02 | CLORAMBUCILE   | LEUKERAN*25CPR RIV 2MG         | Oncologico     | 024790026  | Le compresse di LEUKERAN non devono essere divise.   |   | FALA |
| L01AA03 | MELFALAN   | ALKERAN*25CPR RIV 2MG          | Oncologico     | 021250030  | Le compresse di ALKERAN non devono essere divise.  |   | FALA |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDE   | TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 100MG    | Oncologico     | 041333170  | Le capsule devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere aperte o masticate.   |   | FALA |
|         |  | TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 20MG     | Oncologico     | 041333156  |  |   | FALA |
|         |  | TEMOZOLOMIDE SUN*5CPS 250MG    | Oncologico     | 041333232  |  |   | FALA |
| L01BB02 | MERCAPTOPURINA   | PURINETHOL*25CPR 50MG          | Oncologico     | 010344012  | Si raccomanda che la manipolazione di PURINETHOL Compresse segua le comuni raccomandazioni locali e/o le normative per la manipolazione e l'eliminazione di farmaci citotossici.   |   | FALA |
| L01BB03 | TIOGUANINA   | THIOGUANINE 40 MG CPR          | Oncologico     | 022825018  | Si raccomanda che la manipolazione di tioguanina segua le linee guida che si riferiscono ai farmaci citotossici, in accordo con le normative locali. Se è richiesta la suddivisione a metà di una compressa, si deve prestare attenzione per non contaminare le mani e per non inalare il farmaco (Thioguanine Aspen). |   | FALA |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | NOME COMMERCIALE              | Criterio   | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA  | FORMULAZIONE ALTERNATIVA | FALA |
|---------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------|------|
| L01BB05 | FLUDARABINA      | FLUDARA*20CPR RIV 10MG        | Oncologico | 029552039 | Le compresse devono essere deglutite intere con acqua, non devono essere masticate o spezzate.   |                          | FALA |
| L01BC06 | CAPECITABINA     | CAPECITABINA ACC*120CPR 500MG | Oncologico | 042640274 | Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento e la manipolazione.  |                          | FALA |
|         |                  | CAPECITABINA ACC*60CPR 150MG  | Oncologico | 042640058 |  |                          | FALA |
| L01CA04 | VINORELBINA      | NAVELBINE*1CPS 20MG           | Oncologico | 027865106 | Le capsule di NAVELBINE vanno assunte con un po' d'acqua, e non devono essere né masticate, né succhiate, né dissolte.   |                          | FALA |
|         |                  | NAVELBINE*1CPS 30MG           | Oncologico | 027865118 |  |                          | FALA |
| L01XB01 | PROCARBAZINA     | NATULAN*50CPS 50MG            | Oncologico | 020846010 | ////   |                          | FALA |
| L01XE01 | IMATINIB         | GLIVEC*120CPS 100MG           | Oncologico | 035372059 | E' teratogeno (attenzione nella manipolazione). Le capsule possono essere aperte e sciolte in acqua.   |                          | FALA |
| L01XE02 | GEFITINIB        | IRESSA*3X10CPR RIV 250MG      | Oncologico | 039260017 | La compressa può essere deglutita intera con un po' d'acqua o, se non è possibile assumere la compressa intera, le compresse possono essere somministrate come una dispersione in acqua (non gasata). Non deve essere utilizzato alcun altro liquido. Senza frantumarla, la compressa può essere immersa in mezzo bicchiere d'acqua. Il bicchiere deve essere ruotato di tanto in tanto fino allo scioglimento della compressa (questo può impiegare fino a 20 minuti). La dispersione deve essere bevuta subito dopo che si è completata (cioè entro 60 minuti). Il bicchiere deve essere risciacquato con mezzo bicchiere di acqua, che deve anch'esso essere bevuto. La dispersione può anche essere somministrata attraverso un sondino nasogastrico o una gastrostomia. |                          | FALA |
| L01XE03 | ERLOTINIB        | TARCEVA*30CPR RIV 100MG       | Oncologico | 036871022 | ////   |                          | FALA |
|         |                  | TARCEVA*30CPR RIV 150MG       | Oncologico | 036871034 |  |                          | FALA |
| L01XE04 | SUNITINIB        | SUTENT*30CPS 12,5MG           | Oncologico | 037192022 | Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento e la manipolazione.  |                          | FALA |
|         |                  | SUTENT*30CPS 25MG             | Oncologico | 037192010 |  |                          | FALA |
|         |                  | SUTENT*30CPS 50MG             | Oncologico | 037192034 |  |                          | FALA |
| L01XE05 | SORAFENIB        | NEXAVAR*112CPR RIV 200MG      | Oncologico | 037154010 | Le compresse devono essere deglutite con un bicchiere d'acqua.   |                          | FALA |
| L01XE06 | DASATINIB        | SPRYCEL 60CPR RIV 50MG        | Oncologico | 037400088 | Le compresse non devono essere masticate o frantumate per ridurre al minimo il rischio di esposizione cutanea, devono essere deglutite intere.   |                          | FALA |
|         |                  | SPRYCEL 30CPR RIV 100MG       | Oncologico | 037400114 |  |                          | FALA |
|         |                  | SPRYCEL*30CPR RIV 80MG        | Oncologico | 037400138 |  |                          | FALA |
| L01XE07 | LAPATINIB        | TYVERB*FL 70CPR RIV 250MG     | Oncologico | 038633044 | ////   |                          | FALA |
| L01XE08 | NILOTINIB        | TASIGNA*112CPS 200MG          | Oncologico | 038328035 | Per i pazienti che non riescono a deglutire le capsule rigide, il contenuto di ogni capsula rigida può essere disperso in un cucchiaino da tè di passata di mela (purea di mela) e deve essere assunto immediatamente. Non deve essere utilizzato più di un cucchiaino da tè di passata di mela e nessun altro cibo oltre alla passata di mela   |                          | FALA |
|         |                  | TASIGNA*112CPS 150MG          | Oncologico | 038328062 |  |                          | FALA |
| L01XE10 | EVEROLIMUS       | AFINITOR*30CPR 5MG            | Oncologico | 039398019 | Le compresse di Afinitor devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua. Le compresse non devono essere masticate o frantumate. (Irritante per la mucosa gastrica) ISMP   |                          | FALA |
|         |                  | AFINITOR*30CPR 10MG           | Oncologico | 039398045 |  |                          | FALA |
| L01XE11 | PAZOPANIB        | VOTRIENT*200MG 30CPR          | Oncologico | 039945011 | Le compresse rivestite con film di Votrient devono essere assunte intere con acqua e non devono essere spezzate o frantumate.(la frantumazione fa aumentare  |                          | FALA |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | NOME COMMERCIALE            | Criterio   | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA | FALA |
|---------|------------------|-----------------------------|------------|-----------|---|--------------------------|------|
|         |                  | VOTRIENT*400MG 30CPR        | Oncologico | 039945035 | significativamente AUC e Tmax) ISMP   |                          | FALA |
| L01XE12 | VANDETANIB       | CAPRELSA*30 CPR RIV 100 MG  | Oncologico | 041873011 | Per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire, le compresse di vandetanib possono essere disperse in mezzo bicchiere d'acqua non frizzante. Non deve essere utilizzato  |                          | FALA |
|         |                  | CAPRELSA*30 CPR RIV 300MG   | Oncologico | 041873023 |   |                          | FALA |
| L01XE13 | AFATINIB         | GIOTRIF*28CPR RIV 20MG      | Oncologico | 043023035 | Le compresse devono esser deglutite intere con dell'acqua. Se non è possibile deglutire le compresse intere, possono essere disperse in circa 100 ml di acqua non gassata. Non deve essere utilizzato alcun altro liquido. La compressa deve essere |                          | FALA |
|         |                  | GIOTRIF*28CPR RIV 30MG      | Oncologico | 043023062 |   |                          | FALA |
|         |                  | GIOTRIF*28CPR RIV 40MG      | Oncologico | 043023098 |   |                          | FALA |
|         |                  | GIOTRIF*28CPR RIV 50MG      | Oncologico | 043023124 |   |                          | FALA |
| L01XE14 | BOSUTINIB        | BOSULIF*28CPR RIV 100MG     | Oncologico | 042735011 | ////  |                          | FALA |
|         |                  | BOSULIF*28CPR RIV 500MG     | Oncologico |           | ////  |                          | FALA |
| L01XE15 | VEMURAFENIB      | ZELBORAF*56CPR RIV 240MG    | Oncologico | 041863010 | Le compresse di vemurafenib devono essere inghiottite intere con acqua. Le compresse di vemurafenib non devono essere masticate o schiacciate.  |                          | FALA |
|         |                  | ZELBORAF*240MG 56CPR        | Oncologico | 041863010 |   |                          | FALA |
| L01XE16 | CRIZOTINIB       | XALKORI 250 MG 60CPS RIGIDE | Oncologico | 042549030 | Le capsule devono essere deglutite intere preferibilmente con acqua e non devono essere rotte, sciolte o aperte.  |                          | FALA |
| L01XE17 | AXITINIB         | INLYTA*56CPR RIV 5MG        | Oncologico | 042233054 | Le compresse di axitinib devono essere deglutite intere con un bicchiere di acqua.  |                          | FALA |
|         |                  | INLYTA*56CPR RIV 7MG        | Oncologico | 042233116 |   |                          | FALA |
| L01XE18 | RUXOLITINIB      | JAKAVI*56 CPR 15MG          | Oncologico | 042226023 | ////  |                          | FALA |
|         |                  | JAKAVI*56 CPR 5MG           | Oncologico | 042226011 | ////  |                          | FALA |
| L01XE21 | REGORAFENIB      | STIVARGA*3FL 28CPR RIV 40MG | Oncologico | 042925026 | Le compresse devono essere deglutite intere, con un po' d'acqua, dopo un pasto leggero contenente meno del 30% di lipidi.   |                          | FALA |
| L01XE23 | DABRAFENIB       | TAFINLAR*FL 120CPS 75MG     | Oncologico | 042923045 | Le capsule di dabrafenib devono essere deglutite intere con acqua. Le capsule non devono essere masticate o aperte e non devono essere mescolate con cibo o liquidi a causa dell'instabilità chimica di dabrafenib.                                 |                          | FALA |
| L01XE24 | PONATINIB        | ICLUSIG*FL 30CPR RIV 45MG   | Oncologico | 042853034 | Le compresse devono essere ingerite intere. I pazienti non devono frantumare né sciogliere le compresse   |                          | FALA |
|         |                  | ICLUSIG*FL 60CPR RIV 15MG   | Oncologico | 042853010 |   |                          | FALA |
| L01XX05 | IDROSSICARBAMIDE | ONCOCARBIDE*20CPS 500MG     | Oncologico | 021510019 | ////  |                          | FALA |
| L01XX11 | ESTRAMUSTINA     | ESTRACYT*40CPS 140MG        | Oncologico | 024397010 | ////  |                          | FALA |
| L01XX14 | TRETINOINA       | VESANOID*FL 100CPS 10MG     | Oncologico | 029838024 | Le capsule devono essere ingerite con acqua. Le capsule non devono essere masticate.  |                          | FALA |
| L01XX23 | MITOTANO         | LYSODREN*FL 100CPR 500MG    | Oncologico | 036560011 | ////  |                          | FALA |
| L01XX35 | ANAGRELIDE       | XAGRID*FL 100CPS 0,5MG      | Oncologico | 036745014 | Le capsule devono essere deglutite intere. Non frantumare o diluire il contenuto in un liquido  |                          | FALA |
| L01XX43 | VISMODEGIB       | ERIVEDGE*FL 28CPS 150MG     | Oncologico | 042881019 | Le capsule non devono essere aperte al fine di evitare l'esposizione involontaria verso i pazienti e gli operatori sanitari.  |                          | FALA |
| L02AB01 | MEGESTROLO       | GESTROLTEX*30CPR 160MG      | Endocrina  | 034227013 | ///   |                          | FALA |



| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO      | NOME COMMERCIALE                   | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA  | FORMULAZIONE ALTERNATIVA       | FALA |
|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--|--------------------------------|------|
| L02AB02 | MEDROSSIPROGESTERONE  | PROVERA*30CPR 250MG                | Endocrina           | 020328151 | ///  |                                | FALA |
| L02BA01 | TAMOXIFENE            | KESSAR 20MG 30CPR                  | Endocrina           | 027433022 | ///  |                                | FALA |
| L02BB01 | FLUTAMIDE             | FLUTAMIDE EG*21CPR 250MG           | Endocrina           | 034707012 | ///  |                                | FALA |
| L02BB03 | BICALUTAMIDE          | BICALUTAMIDE AHCL*28CPR RIV50MG    | Endocrina           | 039243011 | ///  |                                | FALA |
|         |                       | BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV150MG   | Endocrina           | 038352124 | Le compresse devono essere deglutite intere con del liquido.   |                                | FALA |
| L02BB04 | ENZALUTAMIDE          | XTANDI*112CPS 40MG                 | Endocrina           | 042868012 | Le capsule devono essere deglutite intere con acqua e possono essere assunte con o senza cibo.   |                                | FALA |
| L02BG03 | ANASTROZOLO           | ANASTROZOLO SUN*28CPR RIV 1MG      | Endocrina           | 040008043 | ///  |                                | FALA |
| L02BG04 | LETROZOLO             | LETROZOLO TEVA*30CPR RIV 2,5MG     | Endocrina           | 040367070 | ///  |                                | FALA |
| L02BG06 | EXEMESTAN             | EXEMESTANE TEVA*30CPR RIV 25MG     | Endocrina           | 040275048 | ///  |                                | FALA |
| L02BX03 | ABIRATENONE           | ZYTIGA 250MG 120CPR                | Endocrina           | 041427016 | Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.  |                                | FALA |
| L04AA06 | MICOFENOLATO MOFENILE | CELLCEPT*50CPR 500MG               | Scheda tecnica      | 029796024 | Poiché il micofenolato mofetile si è dimostrato essere teratogeno nel ratto e nel coniglio, non aprire né rompere le capsule di CellCept                             |                                | FALA |
|         |                       | CELLCEPT*100CPS 250MG              | Scheda tecnica      | 029796012 |  |                                | FALA |
| L04AA06 | MICOFENOLATO SODICO   | MYFORTIC*100CPR RIV 180MG          | Scheda tecnica      | 036511032 | Le compresse di Myfortic non devono essere frantumate per mantenere integro il rivestimento enterico   |                                | FALA |
|         |                       | MYFORTIC*50CPR RIV 360MG           | Scheda tecnica      | 036511069 |  |                                | FALA |
| L04AA13 | SIROLIMUS             | RAPAMUNE*100CPR RIV 1MG            | Scheda tecnica      | 035120070 | La biodisponibilità non è stata determinata per le compresse dopo che siano state frantumate, masticate o spezzate e pertanto ciò non può essere consigliato.        | RAPAMUNE*OS FL 60ML+30SIR DOS+ | FALA |
| L04AA18 | LEFLUNOMINDE          | LEFLUNOMIDE MYL*30CPR RIV 20MG     | Scheda tecnica      | 041230107 | Leflunomide Mylan deve essere deglutita intera con una sufficiente quantità di liquido.  |                                | FALA |
| L04AA31 | TERIFLUNOMIDE         | AUBAGIO*28CPR RIV 14MG             | Scheda tecnica      | 042921027 | Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.  |                                | FALA |
| L04AD01 | CICLOSPORINA          | SANDIMMUN NEORAL 100MG 30CPS MOLLI | Scheda tecnica      | 029453038 | Le capsule di Sandimmun devono essere inghiottite intere   |                                |      |
|         |                       | SANDIMMUN*50CPS 25MG               | Scheda tecnica      | 025306034 |  |                                |      |
|         |                       | SANDIMMUN*50CPS 50MG               | Scheda tecnica      | 025306046 |  |                                |      |
|         |                       | SANDIMMUN NEORAL 10MG 50CPS MOLLI  | Scheda tecnica      | 029453053 |  | SANDIMMUN*OS FL 50ML 100MG/ML  |      |
|         |                       | SANDIMMUN NEORAL 25MG 50CPS MOLLI  | Scheda tecnica      | 029453014 |  |                                |      |
|         |                       | SANDIMMUN NEORAL 50MG 50CPS MOLLI  | Scheda tecnica      | 029453026 |  |                                |      |
| L04AD02 | TACROLIMUS            | ADVAGRAF*30CPS 5MG R.P.            | rilascio modificato | 038218071 | Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua.  |                                |      |
|         |                       | ADVAGRAF*30CPS 3MG R.P.            | rilascio modificato | 038218119 |  |                                |      |
|         |                       | ADVAGRAF*60CPS 1MG R.P.            | rilascio modificato | 038218057 |  |                                |      |
|         |                       | ADVAGRAF*30CPS 0,5MG R.P.          | rilascio modificato | 038218018 |  |                                |      |
| L04AX01 | AZATIOPRINA           | AZATIOPRINA HEX.*50CPR RIV50MG     | Scheda tecnica      | 036292050 | Non ci sono rischi associati alla manipolazione delle compresse con rivestimento integro.  |                                |      |
| L04AX02 | TALIDOMIDE            | THALIDOMIDE CELGENE*28CPS 50MG     | Scheda tecnica      | 038572018 | I pazienti devono essere informati di non dare mai questo medicinale ad altre persone di restituire al farmacista le capsule inutilizzate alla fine del trattamento. |                                |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO       | NOME COMMERCIALE               | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA  | FORMULAZIONE ALTERNATIVA                                     | FALA |
|---------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|--|--|------|
| L04AX04 | LENALIDOMIDE           | REVLIMID*21CPS 15MG            | Scheda tecnica      | 038016034 | Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Le capsule devono essere deglutite intere, preferibilmente con acqua, con o senza assunzione di cibo. Teratogeno.   |  |      |
|         |                        | REVLIMID*21CPS 25MG            | Scheda tecnica      | 038016046 |  |  |      |
|         |                        | REVLIMID*21CPS 10MG            | Scheda tecnica      | 038016022 |  |  |      |
|         |                        | REVLIMID*21CPS 5MG             | Scheda tecnica      | 038016010 |  |  |      |
| L04AX05 | PIRFENIDONE            | ESBRIET*63CPS 267MG            | Scheda tecnica      | 041271014 | Le capsule devono essere ingerite intere   |  |      |
|         |                        | ESBRIET*252CPS 267MG           | Scheda tecnica      | 041271026 |  |  |      |
| M01AB01 | INDOMETACINA           | INDOXEN*25CPS 50MG             | Scheda tecnica      | 020676021 | 1 capsula 2-4 volte al giorno per via orale (ingerire le capsule intere, preferibilmente a stomaco pieno);   | LIOMETACEN*EV IM 6F 50MG+6F2ML                               |      |
|         |                        | INDOXEN*25CPS 25MG             | Scheda tecnica      | 020676019 |  |  |      |
| M01AB05 | DICLOFENAC             | FLOGOFENAC*21CPS 100MG RP      | rilascio modificato | 025536020 | Le capsule vanno deglutite intere con un po' di liquido.   | VOLTAREN*IM 5F 75MG 3ML                                      |      |
|         |                        | DICLOFENAC HEXAL*30CPR 50MG    | Scheda tecnica      | 032786028 | Le compresse vanno deglutite intere con un po' di liquido e non devono essere frantumate o masticate.  |  |      |
| M01AE01 | IBUPROFENE             | BRUFEN 30 CPR RIV 400 MG       | Scheda tecnica      | 022593204 | Assumere Brufen compresse con abbondante acqua. Per evitare fastidio orale ed irritazione della gola le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, spezzate, rotte o succhiate.                             | SPIDIFEN*GRAT 30BUST 600MG<br>MOMENTKID*BB SOSP OS FL 150ML  |      |
|         |                        | BRUFEN 30 CPR RIV 600 MG       | Scheda tecnica      | 022593216 |  |  |      |
| M05BA04 | ACIDO ALENDRONICO      | ALENDRONATO M.G.*4CPR 70MG     | Scheda tecnica      | 037198013 | I pazienti devono ingoiare la compressa di Alendronato Mylan Generics solo intera. I pazienti non devono rompere o masticare le compresse o lasciare disciogliere le compresse in bocca a causa del rischio di ulcerazioni oro-faringee. |  |      |
|         |                        | ALENDROS*14CPR 10MG            | Scheda tecnica      | 029051036 |  |  |      |
| N02AA01 | MORFINA                | TWICE*16CPS 100MG R.P.         | rilascio modificato | 033484041 |  | ORAMORPH*OS 20FL 1D 5ML 10MG<br>ORAMORPH*OS 20FL 1D 5ML 30MG | FALA |
|         |                        | TWICE*16CPS 10MG R.P.          | rilascio modificato | 033484015 |  |  | FALA |
|         |                        | TWICE*16CPS 60MG R.P.          | rilascio modificato | 033484039 |  |  | FALA |
|         |                        | TWICE*16CPS 30MG R.P.          | rilascio modificato | 033484027 |  |  | FALA |
| N02AA03 | IDROMORFONE CLORIDRATO | JURNISTA*14CPR 32MG R.P.       | rilascio modificato | 037396278 |  |  | FALA |
|         |                        | JURNISTA*14CPR 4MG R.P.        | rilascio modificato | 037396518 |  | FALA   |      |
|         |                        | JURNISTA*14CPR 8MG R.P.        | rilascio modificato | 037396037 |  | FALA   |      |
|         |                        | JURNISTA*14CPR 16MG R.P.       | rilascio modificato | 037396153 |  | FALA   |      |
| N02AA05 | OSSICODONE CLORIDRATO  | OXICODONE ACC*28CPR 10MG RP    | rilascio modificato | 034435014 | Le compresse a rilascio prolungato di Oxidone Accord possono essere deglutite sia intere che tagliate, non masticate.  |  | FALA |
|         |                        | OXICODONE ACC*28CPR 20MG RP    | rilascio modificato | 034435077 |  | FALA   |      |
|         |                        | OXICODONE ACC*28CPR 40MG RP    | rilascio modificato | 034435139 |  | FALA   |      |
|         |                        | OXICODONE ACC*28CPR 80MG RP    | rilascio modificato | 042060602 |  | FALA   |      |
|         |                        | OXICODONE ACC*28CPR 5MG RP     | rilascio modificato | 042060044 | Le compresse a rilascio prolungato di Oxidone Accord 5 mg devono essere deglutite intere, non masticate.   |  | FALA |
| N02AB03 | FENTANIL CITRATO       | EFFENTORA*4CPR MUCOSAOS 200MCG | Scheda tecnica      | 038660039 | La compressa non deve essere succhiata, masticata o ingerita, poichè ciò comporterebbe concentrazioni plasmatiche minori rispetto a quando la compressa viene assunta come indicato.   |  | FALA |
|         |                        | EFFENTORA*4CPR MUCOSAOS 600MCG | Scheda tecnica      | 038660078 |  | FALA   |      |
|         |                        | EFFENTORA*4CPR MUCOSAOS 800MCG | Scheda tecnica      | 038660092 |  | FALA   |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO                | NOME COMMERCIALE                  | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA  | FALA |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---|---|------|
|         |                                 | EFFENTORA*4CPR MUCOSAOS 100MCG    | Scheda tecnica      | 038660015 |   |   | FALA |
|         |                                 | VELLOFENT*4CPR SUBL 400MCG        | Scheda tecnica      | 042415303 | Vellofent non deve essere ingoiato, ma deve disciogliersi completamente nella cavità sublinguale, senza essere masticato o succhiato.   |   | FALA |
| N02AX02 | TRAMADOLO                       | TRADONAL SR*30 CPS 50 MG          | rilascio modificato | 034233015 |   | CONTRAMAL*OS GTT 10ML 100MG/ML  | FALA |
|         |                                 | CONTRAMAL SR100 100MG 20CPR       | rilascio modificato | 028853036 |   |   | FALA |
|         |                                 | CONTRAMAL SR150 150MG 10CPR       | rilascio modificato | 028853075 |   |   | FALA |
|         |                                 | CONTRAMAL SR 200*10CPR R.P.       | rilascio modificato | 028853087 |   |   | FALA |
| N02CC01 | SUMATRIPTAN                     | SUMATRIPTAN TEVA*4CPR RIV50MG     | Scheda tecnica      | 037998034 | Le compresse devono essere ingerite intere con dell'acqua.  | IMIGRAN*SC 2SIR 6MG 0,5ML+AUTO  |      |
|         |                                 | SUMATRIPTAN TEVA*4CPR RIV 100MG   | Scheda tecnica      | 037998123 |   |   |      |
| N03AF01 | CARBAMAZEPINA                   | TEGRETOL*30CPR 200MG R.M.         | rilascio modificato | 020602049 | Le compresse a rilascio modificato (sia intere che spezzate a metà) devono essere ingerite, senza masticare, con un po' di liquido  | TEGRETOL*BB SCIR FL 250ML/20MG<br>TEGRETOL*30CPR 400MG<br>TEGRETOL*50CPR 200MG                  |      |
|         |                                 | TEGRETOL*30CPR 400MG R.M.         | rilascio modificato | 020602052 |   |   |      |
| N03AG01 | ACIDO VALPROICO                 | DEPAKIN*CHRONO 30CPR 500MG R.P    | rilascio modificato | 022483111 | Rivestimento gastroresistente   | DEPAKIN*OS FL 40ML 200MG/ML<br>DEPAKIN*GRAT 30BUST 100MG R.M.<br>DEPAKIN*GRAT 30BUST 250MG R.M. |      |
|         |                                 | DEPAKIN*FL 40CPR GASTROR 200MG    | Scheda tecnica      | 022483248 |   |   |      |
|         |                                 | DEPAKIN*40CPR GASTROR 500MG       | Scheda tecnica      | 022483251 |   |   |      |
|         |                                 | DEPAKIN*CHRONO 30CPR 300MG R.P    | rilascio modificato | 022483109 |   |   |      |
| N03AX11 | TOPIRAMATO                      | TOPAMAX 15 MG 60 CPS              | Scheda tecnica      | 032023083 | La formulazione in capsule rigide è destinata ai pazienti con difficoltà di deglutizione delle compresse, ad esempio, pazienti pediatrici e anziani.<br><u>Le capsule rigide di Topamax possono essere deglutite intere oppure possono essere</u><br>Le compresse rivestite con film di Topiramato EG 25 mg devono essere deglutite intere con una sufficiente quantità di acqua. | TOPAMAX*60CPS 15MG  |      |
|         |                                 | TOPIRAMATO EG*60CPR RIV 100MG     | Scheda tecnica      | 038314163 |   |   |      |
|         |                                 | TOPIRAMATO EG*60CPR RIV 200MG     | Scheda tecnica      | 038314225 |   |   |      |
|         |                                 | TOPIRAMATO EG*60CPR RIV 25MG      | Scheda tecnica      | 038314047 |   |   |      |
|         |                                 | TOPIRAMATO EG*60CPR RIV 50MG      | Scheda tecnica      | 038314100 |   |   |      |
| N03AX12 | GABAPENTIN                      | GABAPENTIN TEVA PH*50CPS 300MG    | Scheda tecnica      | 036698189 | Gabapentin può essere assunto con o senza cibo, e la compressa deve essere ingerita intera con una sufficiente quantità di liquido  |   |      |
|         |                                 | GABAPENTIN TEVA*30CPS 400MG       | Scheda tecnica      | 036698468 |   |   |      |
|         |                                 | GABAPENTIN TEVA*50CPS 100MG       | Scheda tecnica      | 036698037 |   |   |      |
| N04AA02 | BIPERIDENE                      | AKINETON 4MG 50CPR A RIL.PROLUNG. | rilascio modificato | 028330037 |   | AKINETON FIALE*IM EV 5F 5MG1ML  |      |
| N04BA02 | LEVODOPA+ BENZERAZIDE           | MADOPAR*30CPS 100MG+25MG          | Scheda tecnica      | 023142019 | Le capsule devono essere inghiottite intere e non aperte o disciolte in liquidi.  | MADOPAR*30CPR DISPERS 100+25MG<br>MADOPAR*50CPR DIV 200MG+50MG                                  |      |
|         |                                 | MADOPAR*30CPS 100MG+25MG R.P.     | rilascio modificato | 023142045 |   |   |      |
| N04BA02 | LEVODOPA+ CARBIDOPA             | SINEMET*50CPR 100MG+25MG R.M.     | rilascio modificato | 023145042 |   | SINEMET*50CPR 100MG+25MG<br>SINEMET*50CPR 250MG+25MG  |      |
|         |                                 | SINEMET*30CPR 200MG+50MG R.M.     | rilascio modificato | 023145030 |   |   |      |
| N04BA03 | LEVODOPA+ CARBIDOPA+ ENTACAPONE | STALEVO*100CPR 200+50+200MG       | Scheda tecnica      | 036825216 | Una compressa contiene una dose per il trattamento e deve essere somministrata soltanto intera.   |   |      |
|         |                                 | STALEVO*100CPR 50+12,5+200MG      | Scheda tecnica      | 036825038 |   |   |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | NOME COMMERCIALE               | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA  | FORMULAZIONE ALTERNATIVA  | FALA |
|---------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|--|---|------|
|         |                  | STALEVO*100CPR 75+18,75+200MG  | Scheda tecnica      | 036825242 |  |   |      |
|         |                  | STALEVO*100CPR 100+25+200MG    | Scheda tecnica      | 036825077 |  |   |      |
|         |                  | STALEVO*100CPR 125+31,25+200MG | Scheda tecnica      | 036825255 |  |   |      |
|         |                  | STALEVO*100CPR 150+37,5+200MG  | Scheda tecnica      | 036825115 |  |   |      |
| N04BC04 | ROPINIROLO       | REQUIP*28CPR 2MG R.P.          | rilascio modificato | 032261190 |  | REQUIP*21CPR 0,25-0,5-1-2-5 MG                                  |      |
|         |                  | REQUIP*28CPR 4MG R.P.          | rilascio modificato | 032261240 |  |   |      |
|         |                  | REQUIP*28CPR 8MG R.P.          | rilascio modificato | 032261265 |  |   |      |
| N04BC05 | PRAMIPEXOLO      | MIRAPEXIN*10CPR 0,26MG R.P.    | rilascio modificato | 034090136 |  | MIRAPEXIN 0,18MG BASE/1MG SALE<br>MIRAPEXIN 0,7MG BASE/1MG SALE |      |
|         |                  | MIRAPEXIN*10CPR 0,52MG R.P.    | rilascio modificato | 034090163 |  |   |      |
|         |                  | MIRAPEXIN*30CPR 1,05MG R.P.    | rilascio modificato | 034090201 |  |   |      |
|         |                  | MIRAPEXIN*30CPR 2,1MG R.P.     | rilascio modificato | 034090237 |  |   |      |
|         |                  | MIRAPEXIN*30CPR 3,15MG R.P.    | rilascio modificato | 034090264 |  |   |      |
| N05AH04 | QUETIAPINA       | QUETIAPINA TEVA 60CPR 200MG RP | rilascio modificato | 040433144 |  | QUENTIAX*30CPR RIV<br>25MG,100MG,200MG,300MG                    |      |
|         |                  | QUETIAPINA TEVA 60CPR 300MG RP | rilascio modificato | 040433221 |  |   |      |
|         |                  | QUETIAPINA TEVA 60CPR 400MG RP | rilascio modificato | 040433308 |  |   |      |
|         |                  | QUETIAPINA TEVA 60CPR 50MG RP  | rilascio modificato | 040433068 |  |   |      |
| N05AL05 | AMISULPRIDE      | AMISULPRIDE M.G.*30CPR 200MG   | Scheda tecnica      | 039402110 | Le compresse devono essere assunte intere o divise in due, con una sufficiente quantità di liquido.  |   |      |
|         |                  | AMISULPRIDE M.G.*30CPR 400MG   | Scheda tecnica      | 039402161 |  |   |      |
| N05BA12 | ALPRAZOLAM       | XANAX*20CPR 0,50MG             | Scheda tecnica      | 025980069 | Le compresse devono essere assunte intere; non devono essere masticate e non devono essere frantumate o divise.  | XANAX*OS GTT FL 20ML 0,75MG/ML                                  |      |
| N05CD01 | FLURAZEPAM       | DALMADORM*30CPS 30MG           | Scheda tecnica      | 022717045 | Ingoiare con acqua, senza masticare  |   |      |
| N06AA04 | CLOMIPRAMINA     | ANAFRANIL*20CPR DIV 75MG R.P.  | rilascio modificato | 021643046 | Le compresse a rilascio prolungato da 75 mg sono divisibili in due metà esattamente uguali   | ANAFRANIL*IM IV 5F 2ML 25MG                                     |      |
|         |                  | ANAFRANIL*20CPR RIV 25MG       | Scheda tecnica      | 021643010 | Le compresse rivestite devono essere deglutite intere.   |   |      |
|         |                  | ANAFRANIL*50CPR RIV 10MG       | Scheda tecnica      | 021643022 |  |   |      |
| N06AB05 | PAROXETINA       | SEREUPIN*28CPR RIV 20MG        | Scheda tecnica      | 027965033 | Le compresse devono essere deglutite piuttosto che masticate.  | DROPAXIN*OS GTT 60ML 10MG/ML                                    |      |
| N06AX03 | MIANSERINA       | LANTANON*30CPR RIV 30MG        | Scheda tecnica      | 023695036 | Le compresse vanno deglutite senza essere masticate  | LANTANON*GTT 15ML 60MG/ML                                       |      |
| N06AX05 | TRAZODONE        | TRITTICO*30CPR DIV 75MG R.P.   | rilascio modificato | 022323063 | Per preservare le caratteristiche di rilascio prolungato della formulazione, le compresse devono essere divise (quando previsto) utilizzando la linea di frattura presente su entrambi i lati della compressa, e non devono essere né masticate né frantumate. | TRITTICO*OS GTT 30ML 25MG/ML                                    |      |
|         |                  | TRITTICO*20CPR DIV 150MG R.P.  | rilascio modificato | 022323075 |  |   |      |
| N06AX16 | VENLAFAXINA      | EFEXOR*28CPS 37,5MG R.P.       | rilascio modificato | 028831129 | Le capsule a rilascio prolungato di venlafaxina contengono sferoidi, che rilasciano il principio attivo lentamente nel tratto digestivo.   |   |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | NOME COMMERCIALE                        | Criterio            | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA   | FORMULAZIONE ALTERNATIVA                         | FALA |
|---------|------------------|---|---------------------|-----------|---|--|------|
|         |                  | EFEXOR*10CPS 150MG R.P.                 | rilascio modificato | 028831067 |   | ZAREDROP 75 mg/ml SOL OS 60 ML                   |      |
|         |                  | EFEXOR*14CPS 75MG R.P.                  | rilascio modificato | 028831055 |   |  |      |
| N06BA04 | METILFENIDATO    | MEDIKINET*30 CPS 10MG RM                | rilascio modificato | 041889104 | Le capsule possono essere ingoiate intere con l'aiuto di liquidi, o in alternativa, è possibile aprire le capsule e distribuire il loro contenuto su una piccola quantità (un cucchiaino) di salsa di mele o di yogurt, da prendere immediatamente, senza conservarla per un utilizzo futuro. Dopo aver assunto il contenuto della capsula con salsa di mele o yogurt, occorre bere ad esempio dell'acqua o altri liquidi. Le capsule e il contenuto delle capsule non devono essere schiacciati o masticati. | RITALIN 10 MG CPR                                |      |
|         |                  | EQUASYM*30 CPS 30MG RM                  | rilascio modificato | 041889155 | Equasym consiste di un componente a rilascio immediato (30% della dose) e di un componente a rilascio modificato (70% della dose).  | RITALIN 10 MG CPR                                |      |
|         |                  | EQUASYM*30 CPS 20 MG RM                 | rilascio modificato | 041889104 |   |  |      |
|         |                  | EQUASYM*30 CPS 10MG RM                  | rilascio modificato | 041889041 |   |  |      |
| N06BA07 | MODAFINIL        | PROVIGIL*30CPR 100MG                    | Scheda tecnica      | 034369013 | Le compresse vanno inghiottite intere.  |  |      |
| N06BA09 | ATOMOXETINA      | STRATTERA*7CPS 10MG                     | ISMP                | 037063070 | Il contenuto della capsula può provocare irritazione oculare  |  |      |
|         |                  | STRATTERA*28CPS 18MG                    | ISMP                | 037063118 |   |  |      |
|         |                  | STRATTERA*28CPS 25MG                    | ISMP                | 037063157 |   |  |      |
|         |                  | STRATTERA*28CPS 40MG                    | ISMP                | 037063195 |   |  |      |
|         |                  | STRATTERA*28CPS 60MG                    | ISMP                | 037063233 |   |  |      |
| N06DA03 | RIVASTIGMINA     | NIMVASTID*56CPS 1,5MG                   | Scheda tecnica      | 041673043 | Le capsule vanno deglutite intere.  | EXELON*30CER 9,5MG/24H<br>EXELON*30CER 4,6MG/24H |      |
|         |                  | NIMVASTID*56CPS 3MG                     | Scheda tecnica      | 041673106 |   |  |      |
|         |                  | NIMVASTID*56CPS 4,5MG                   | Scheda tecnica      | 041673169 |   |  |      |
|         |                  | NIMVASTID*56CPS 6MG                     | Scheda tecnica      | 041673221 |   |  |      |
| N06DA04 | GALANTAMINA      | GALNORA*28CPS 8MG RP                    | rilascio modificato | 039889136 | Le capsule devono essere deglutite intere con l'aiuto di liquidi. Non devono essere masticate né frantumate.  |  |      |
|         |                  | GALNORA*28CPS 16MG RP                   | rilascio modificato | 039889314 |   |  |      |
|         |                  | GALNORA*28CPS 24MG RP                   | rilascio modificato | 039889504 |   |  |      |
| N07AA02 | PIRIDOSTIGMINA   | MESTINON*50CPR 180MG R.P.               | rilascio modificato | 009286042 | Le compresse a rilascio prolungato vengono assunte con una certa quantità di liquido ed hanno un solco centrale che ne consente la frattura per l'eventuale   | MESTINON*20CPR 60MG                              |      |
| N07XX09 | DIMETILFUMARATO  | TECFIDERA*14CPS 120MG                   | Scheda tecnica      | 043217013 | La capsula o il suo contenuto non devono essere schiacciati, divisi, disciolti, succhiati o masticati, dato che il rivestimento enterico delle microcompresse previene gli effetti irritanti sull'intestino.  |  |      |
|         |                  | TECFIDERA*56CPS 240MG                   | Scheda tecnica      | 043217025 |   |  |      |
| R03DA04 | TEOFILLINA       | THEODUR 300MG 30CPR RILASCIO PROLUNGATO | rilascio modificato | 025267016 | Theo-Dur in somministrazione dose unica giornaliera deve essere assunto intero senza essere spezzato.   | AMINOMAL 0,67% SOL. ORALE 200 ML                 |      |
|         |                  | THEOLAIR SR 350*30CPR 350MG             | rilascio modificato | 025730021 | Le compresse di Theolair, sia da 250 mg che da 350 mg di teofillina, portano incisa su un lato una linea di pre-rottura, per consentire l'eventuale dimezzamento della dose.  |  |      |

| ATC     | PRINCIPIO ATTIVO | NOME COMMERCIALE           | Criterio       | AIC       | INDICAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA TECNICA                            | FORMULAZIONE ALTERNATIVA   | FALA |
|---------|------------------|----------------------------|----------------|-----------|--|----------------------------|------|
| V03AE02 | SEVELAMER        | REVELA*FL 180CPR RIV 800MG | Scheda tecnica | 039480037 | Non devono essere triturate o masticate, ma inghiottite come tali. | REVELA*OS POLV 60BUST 2,4G |      |